

Bệnh tụ huyết trùng và bệnh dịch tả vịt

1. Bệnh tụ huyết trùng vịt

Nguyên nhân: Pasteurella multocida (vi khuẩn)

Dịch tễ: mọi lứa tuổi, giao mùa

Triệu chứng:

- Quá cấp: chết rất nhanh (sau bữa ăn...) nên không kịp có biểu hiện triệu chứng
- Cấp tính: ủ rũ, kém ăn, xiêu vẹo, bại cánh, liệt chân, khô khè, phân lỏng vàng xám đôi khi lẫn máu, châu máu mũi & miệng; sốt (43-44oC), khát, nằm bẹp, giãy chết sau 2-5 ngày; tỉ lệ chết đêm bất thường; thả đồng: lụi xa đàn

- Á cấp: đau mắt, chảy nước mũi, sưng khớp, viêm não

Bệnh tích: toàn thân tím bầm, phổi tụ máu tím đen, ruột viêm đỏ

Phòng bệnh:

- Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch

- Kháng sinh, sulfamid: 3-5 ngày

- Vaccin

Điều trị:

- Phân loại (khỏe, bệnh)

- Kháng huyết thanh (tiêm 1 lần tác dụng 15 ngày)

- Kháng sinh: Peni + Strep, Cefa + Flor, Spira + Kana, Kana + Ampic + Colis, Peni + Kana, Kana + Ampic, Septryl, Sulfa... ; tiêm những con khỏe trước; không thả xuống nước

2. Bệnh dịch tả vịt

Nguyên nhân: virus

Dịch tễ: mọi lứa tuổi, diễn biến nhanh (3-4 ngày), chết 90%

Triệu chứng:

- Bỏ ăn, sốt cao, khát, chảy nước mũi (trong à đục à bít lỗ mũi à thở khó), ủ rũ, xệ cánh, chúi đầu, không thích bơi lội

- Phân xanh, loãng, đôi khi lẫn máu, dính bết quanh lỗ huyết

- Phù đầu nhưng mắt không chảy nước lẫn bọt khí (khác bệnh sưng phù đầu / coryza)

- Chảy nước mắt, viêm kết mạc à ghèn, mi mắt sưng

- Liệt chân, sợ ánh sáng, lòi gai sinh dục (đực)

- 1 số: đầu cổ rung giật

Bệnh tích:

- Xuất huyết toàn thân (đặc trưng ở đường tiêu hóa)

- Cuồng mề, trực tràng xuất huyết, phủ màng giả khó bóc

- Gan màu đồng, chấm hoại tử trắng, mật sưng

- Phòng bệnh: tiêm vaccin (nhược độc, đông khô): 14 ngày tuổi (vùng an toàn), 1 & 21 ngày tuổi (vùng có dịch)

Điều trị:

- Không có thuốc điều trị đặc hiệu

- Phát hiện, chẩn đoán kịp thời; cách ly vịt bệnh, tiêm vaccin (Kapevac...) cho vịt khỏe

- Sát trùng (diệt mầm bệnh), uống kháng sinh (phòng nhiễm khuẩn kế phát), vitamin + electrolytes (nâng cao đề kháng)

Theo Vietlinh.vn